



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА, ПЛАНИРУЮЩЕГО ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С

- 1.Схему лечения и ее продолжительность назначает врач-инфекционист с учетом формы и стадии заболевания у конкретного пациента.
- 2.Лечение направлено на полное уничтожение вируса гепатита «С» в организме пациента. Эффективность современных противовирусных схем лечения составляет 99%.
- 3.Перед началом лечения необходима консультация врача-инфекциониста с целью подбора схемы лечения, совместимой с препаратами, которые пациент принимает по поводу других заболеваний.
- 4.Переносимость современных противовирусных препаратов хорошая, поэтому лечение проводится амбулаторно (в домашних условиях).
- 5.Для достижения наилучшего результата противовирусные препараты необходимо принимать ежедневно в одно и то же время. Отклонение от заданного времени не должно превышать один час.
6. Противовирусные препараты не совместимы с любыми напитками, содержащими алкоголь.
- 7.Противовирусная терапия не требует от пациента специальной диеты, за исключением продуктов, указанных ниже.
- 8.Противовирусные схемы, содержащие софосбувир, не совместимы с веществами, содержащимися в грейпфруте и зверобое продырявленном. Поэтому данные продукты нужно исключить на время приема препаратов.
9. Противовирусные таблетки нужно проглатывать целиком, не жевать, так как внутри они имеют неприятный запах и вкус.
- 10.В связи с тем, что влияние противовирусных препаратов на плод не известно, женщинам детородного возраста, проходящим терапию, и их партнерам необходимо использовать противозачаточные средства в течение всего срока лечения и 5-6 месяцев после его завершения.
- 11.В случае возникновения непредвиденных обстоятельств в процессе лечения пациенту необходимо незамедлительно сообщить о них лечащему врачу.
- 12.Надеемся, что эти простые советы помогут Вам в достижении скорейшей и окончательной победы над вирусом гепатита «С».

С уважением администрация ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского»